

2) 씨암마

분만 후에 암말에서 발병하는 경우는 거의 없으나 분만 산통이 일어날 수 있다. 보통 분만 산통은 분만 후 10~15분에 발생하기도 하며, 수 시간이 지나도 발생하지 않는 경우도 있다. 분만 산통은 자궁의 크기를 줄이기 위해 자궁을 수축함으로써 발생한다. 일반적으로 처치는 필요하지 않지만 진정제를 주사하여 도움을 줄 수 있다.

태반의 일부가 자궁에 남아있게 되면, 다음날 암말은 산통의 증상을 보이며, 체온이 상승하고, 혈압과 맥박이 상승하고 절뚝거림이 나타날 수 있다. 이런 경우 수의사의 조치가 필요하다.

내부 출혈은 보통 사망에까지 이른다. 자궁의 손상, 자궁동맥의 파열에 의해 발생하며 암말은 내부에 출혈을 하게 된다. 처음에는 상태가 산통 증상과 유사하며, 증상이 심해지다가 결국 사망하게 된다.

분만 후에 통증이 수반되기 때문에 어떤 암말들은 배변하는데 머뭇거리게 된다. 이런 증상이 관찰되면 미네랄 오일이 함유된 갈아 으깨 놓은 밀기울을 공급하거나 위관으로 미네랄 오일을 공급한다.